Bem. 3) Aber wofür das Ganze?

Warum ist Diffbarkeit interessant / nützlich für uns?

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x_0 \in \mathbb{R} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{|x - x_0|} = 0$$

existiert nicht immer! z.B.

$$f(x) = -|x|$$

an der Stelle $x_0 = 0$:

$f'(x_0)$ existiert nicht.

Warum? → Wir versuchen, die Funktion mit Geraden anzunähern.

$$\tilde{f}(x) = a(x - x_0) + f(x_0) = ax$$

In $\mathbb{R}^n$ funktioniert das genau so.

Die Geometrische Interpretation des Differentials:

$$f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x_0 \in \Omega$$

nehmen an: f ist an der Stelle x_0 diffbar.

$$\tilde{f}(x) = df_{x_0}(x - x_0) + f(x_0) \text{ ist affine lineare Funktion}$$

$$df(x_0)$$

$$\tilde{f}(x) = \sum_{i=1}^n \frac{df}{dx_i}(x_0) (x^i - x_0^i) + f(x_0)$$

$$|f(x) - \tilde{f}(x)| \ll \|x - x_0\|$$

$$\text{d.h. } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{|f(x) - \tilde{f}(x)|}{\|x - x_0\|} = 0$$

⇒ Funktion mit einer einfachen Funktion ($\tilde{f}(x)$) annähern

↳ das ist unsere Motivation, warum wir differenzieren!

Was ist der Graph von der affinen linearen Funktion $\tilde{f}(x)$?

$$\text{Graph}(\tilde{f}) = \left\{ \underbrace{(x^1, \dots, x^n)}_x, x^{n+1} \right\} \in \mathbb{R}^{n+1} \text{ mit } x^{n+1} = \tilde{f}(x) \left. \begin{array}{l} \uparrow \\ \text{wird an jeder Stelle } x_0 \\ \text{aufgebaut.} \end{array} \right\}$$

$$= \left\{ \left(x, \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) (x - x_0) + f(x_0) \right) \right\}$$

Sei $n=2$ (Dimension 2) allgemein: für dieses Kapitel alles mit Dim 2 interpretieren.

$$x^3 = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) (x^1 - x_0^1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0) (x^2 - x_0^2) + f(x_0)$$

$$\Leftrightarrow x^3 - \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0) x^2 - \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) x^1 = f(x_0) - \frac{\partial f}{\partial x_2} x_0^2 - \frac{\partial f}{\partial x_1} x_0^1$$

$$\Leftrightarrow x^3 + a_2 x^2 + a_1 x^1 = b \quad \leftarrow \text{eine 2D-Ebene in } \mathbb{R}^3!$$

↳ Das ist die Gleichung der 2-dim Ebene, die $\perp$ zu

dem Vektor $\begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) \\ -\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0) \\ 1 \end{pmatrix}$ ist und die durch $(x_0, f(x_0))$ geht.

→ wenn wir f mit $\tilde{f}$ ersetzen, ist der Fehler, der dabei entsteht, kleiner als $\|x - x_0\|$ an der Stelle x_0 .

im Allgemeinen (d.h. n beliebig): Der Graph von $\tilde{f}$ (= linear affine Annäherung von f) = die n dimensionale "Ebene", welche orthogonal ist

zum Vektor $\begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) \\ \vdots \\ -\frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0) \\ 1 \end{pmatrix}$, die durch $(x_0, f(x_0))$ geht.

III.1.5 Beispiele und Gegenbeispiele für Differenzierbarkeit

1) affine lineare Funktionen: $f(x) = Ax + b$

$$A = (a_1, \dots, a_n)$$

vorgegebener Kovektor

$$Ax = (a_1, \dots, a_n) \sum_{i=1}^n a_i x_i$$

f ist überall diffbar und $\frac{df}{dx_i}(x_0) = a_i$

unabhängig von x_0

$$df(x)h = \sum_{i=1}^n \frac{df}{dx_i}(x_i) h^i$$

beliebig in $\mathbb{R}^n$

Koordinatenfunktionen: (= affine lineare Funktionen für

$$i \in \{1, \dots, n\} \quad A_i = (0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$$

$$b = 0$$

$$f(x) = x^i$$

$$df_{(x_0)} = dx^i = (0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$$

Covektor. Bilden eine Basis von dem n -dimensionalen Raum von Co-Vektoren

$$L_i = M_{1 \times n}(\mathbb{R}) \text{- Matrizen}$$

Sei f eine beliebige diffbare Funktion auf $\Omega \subset \mathbb{R}^n$

Man kann $df_{(x_0)}$ mit der Hilfe von $(dx^i)_{i=1 \dots n}$ ausdrücken

$$df_{(x_0)}h = \sum_{i=1}^n \frac{df}{dx_i}(x_0) \cdot h^i$$

i -te Koordinate vom Vektor h .

$$\forall i=1 \dots n: dx^i h = h^i$$

$$\Rightarrow df_{(x_0)}h = \sum_{i=1}^n \frac{df}{dx_i}(x_0) dx^i \cdot h$$

$\forall h$ Vektor in $\mathbb{R}^n$

kann man alles ohne h schreiben

$$\Rightarrow df_{(x_0)} = \sum_{i=1}^n \frac{df}{dx_i}(x_0) dx^i$$

das ist eine Gleichung zwischen Co-Vektoren in $M_{1 \times n}(\mathbb{R})$

Achtung! Es gibt Funktionen, bei denen $\otimes$ existiert, aber $\circledast$ nicht und umgekehrt.

2) Gegenbeispiel von Diffbarkeit: Die "Dachfunktion":

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(0, x^2) \equiv 0$$

$$f(x^1, 0) \equiv 0$$

ist die einzige Wahl für $df(0)$

↳ wir haben ein Problem!

$$\lim_{x^2 \rightarrow 0} \frac{f(0, x^2) - f(0, 0)}{x^2} = 0 = \frac{df}{dx^2}(0)$$

$$\frac{df}{dx^1}(0, 0) = 0$$

} 2 part. Ableitungen.

→ Falls $df(0)$ existiert, muss $df(0, 0) = 0$ sein.

$$e = \left(\cos \frac{\pi}{4}, -\sin \frac{\pi}{4} \right)$$

Wir machen einen Schnitt: $f(0+he) = -|h|$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(he) - 0}{h} \text{ existiert nicht!}$$

→ d.h.: die Funktion besitzt part. Ableitungen bez. kanonische Achsen, sie ist jedoch nicht diffbar! → etwas ist schief geloffen...
 → Warnung: es reicht nicht, die part. Ableitungen auszurechnen um Diffbarkeit zu bestimmen!

3) Beispiel

$$f(x, y) = x e^y$$

$$\begin{cases} \frac{df}{dx}(x_0, y_0) = e^{y_0} \\ \frac{df}{dy}(x_0, y_0) = x_0 e^{y_0} \end{cases}$$

$$df_{(x_0, y_0)}(x - x_0, y - y_0) = e^{y_0}(x - x_0) + x_0 e^{y_0}(y - y_0)$$

Wenn Differential existiert, dann muss es diese Form haben!

Überprüfen: (damit keine Probleme wie in 2))

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{|f(x, y) - f(x_0, y_0) - df_{(x_0, y_0)}(x - x_0, y - y_0)|}{\|(x - x_0, y - y_0)\|_2} \stackrel{?}{=} 0$$

falls ja = gute Approximierung von f

$$\Rightarrow \frac{|f(x, y) - f(x_0, y_0) - df_{(x_0, y_0)}(x - x_0, y - y_0)|}{\|(x - x_0, y - y_0)\|_2} = \frac{|x(e^y - e^{y_0}) - x_0 e^y(y - y_0)|}{\sqrt{|x - x_0|^2 + |y - y_0|^2}}$$

Taylor Entwicklung von e^y an der Stelle y_0 liefert die Existenz von $r_{y_0}(y)$

(Kowalski: Kor. 5.7.8
Struwe: Satz 5.5.1)

$$e^y - e^{y_0} = \underbrace{e^{y_0}}_{(e^y)'} (y - y_0) + (y - y_0) \cdot \underbrace{r_{y_0}(y)}_{\text{Rest}} \quad \lim_{y \rightarrow y_0} r_{y_0}(y) = 0$$

wir bekommen schlussendlich:

$$\dots = \frac{|(x - x_0)(y - y_0) e^{y_0} + x(y - y_0) \cdot r(y - y_0)|}{\sqrt{|x - x_0|^2 + |y - y_0|^2}} = \otimes$$

$$\frac{(x - x_0)(y - y_0) e^{y_0}}{\sqrt{|x - x_0|^2 + |y - y_0|^2}} \rightarrow 0 \quad \text{weil } \sqrt{|x - x_0|^2 + |y - y_0|^2} \geq \max(|x - x_0|, |y - y_0|)$$

$$(*) = \frac{|x-x_0||y-y_0|e^{y_0}}{|x-x_0|} + \frac{|x||y-y_0|r_y(y)}{|y-y_0|} \xrightarrow{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} 0$$

Somit: $f(x,y) = xe^y$ ist überall diffbar.

Ergänzung zu den Koordinaten Funktionen

$$\begin{array}{l} x \in \mathbb{R}^n \mapsto x_j \quad (dx_j)_{j=1 \dots n} \\ \text{"} \\ (x_1, \dots, x_n) \end{array}$$

$$\frac{\partial x_j}{\partial x_i} = \delta_{ij} \quad \text{Kronecker-Symbol}$$

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$